

Mourvèdre précoce

Vass8R12s056-060



Collection Vassal-Montpellier

OMtp757

cl 8 R12 s56-60  
Mourvèdre précoce

Mourvèdre précoce


cl 8 R12 s56-60

# Mourvèdre  
baie noire, sphérique  
moyenne  
assez précoce
















CLOS 8 RANG 12 Souche 56-60

Désignation : *Maurwidre précoce*

CHARGE :

Année :

Véraison :

25.7

Maturité :

12.8.88

Mill.: 0

Pour.: 0

GRAPPE :

G - M

P -

Dim.: 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT :

érig -

1/2

érig -

couché

EAIE :

Année :

TG - G - M

P -

Dim.: 15

disc.

sph.

-ell.

-ov.

-obov.

-cyl.

-fus.

COULEUR :

Bl -

Gr -

Rs -

Rg -

N.

SAVEUR :

s -

m -

ar -

fox -

herb.

s1 4

Avec pépins -

apyrène

s2 4

JUS :

inc. -

coloré

s3 5

s4 5

s5 8



DESIGNATION : Mauviedre précoce mi

EMPLACEMENT : 8 R12 156.60

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 3,200 0kg 800

Nombre de souches : 4 (178g)

Nombre de grappes : 18

Pourriture : 0

Couleur : Noir x4.5 (Ic=0.765)

Indice réfract. : 18.2 (9.9)

Acidité du moût : 3.5

Date : 15.4

Pressurage

Densité : 1018

Date : 22.9

Mise en bouteille

Densité : 995

Degré alcoolique : 10.2

Acidité du vin : 3.2

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2,1  
équilibre, bien -

ANNEE 1987

NOM Mauviedre précoce

EMPLACEMENT 8 R12 156.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	24	7.4	0								
2	2	3.4	7.4	2								
3	2	31.3	3.4	1								
4	4	3.4	7.4	4		3.6	7.6	12.6	24.7	27.7	30.7	77.8
5	4	31.3	7.4	1						+1		0
	14		6.4	8	5.5		7.6					
			+10				0					

erige  
a 1/2 erige  
V. 3



ANNEE 1988

NOM Mourvèdre précoce

EMPLACEMENT 8 R 12 A 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	28.3	5.4	4								
2	4	1.4	5.4	4								
3	4	5.4	8.4	5	14	31.5	3.6	6.6	18.7	25.7	28.7	42.8
4	2	5.4	8.4	5								
5	4	8.4	11.4	8								
			8.4				3.6					
			+15				+3			+1		-1

Pourriture : 0

Port : mi'ange

Vigueur : 3 moy.

ANNEE 1989

NOM Mourvèdre précoce

EMPLACEMENT 8 R 12 A 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	27.3	31.3	1								
2	4	23.3	27.3	6		22.5	24.5					
3	6	23.3	27.3	8	11	22.5	24.5	30.5	17.7	24.7	31.7	41.8
4	4	23.3	27.3	4		24.5	-3			+1		+2
5	4	20.3	23.3	3		24.5						

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi'ange

Vigueur : 3

à 27.3.89 +9



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Mourvière pécoce

8 R 12 s-56-60 (s.57)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sèteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sèteuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sèteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sèteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sèteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Mourvière précocée

8 R 120. 56-60 (257)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.  
sans villosité pubescente 250 - sans villosité laineuse 251.  
Entièrement - partiellement.

Méridienne : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

♀

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Mourvière précoce

8 R 12 s. 56-60 (s. 58)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 87



N° d'ordre : *Mourvèdre précoce*  
Désignation : *clon 8 R 12 A.56-60 (259)*  
Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3. (dimensions : *13* x )  
24 - Lâche 4 - Moyen 5 - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *2* - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle blanché 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 -  
de taille régulière *6* - irrégulière 8. (dimensions : *18* x *18* ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.  
27 - Très pruinée *7* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *2* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - *sphéroïde 1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - cubovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
8 - peu apparent *9*.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4  
herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière *9*.  
A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.  
A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

*Calvo 85*



DENOMINATION : *Mauviedre précoce*  
EMPLACEMENT : *8 R 12 A 56,60 (A.59)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - *fortement* côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....9... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation : *Mourvèdre précoce*

Emplacement : *8R12 s. 56-60*

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : ⑩ - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③⑦  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - ③⑦ - ③⑧ - ③⑨  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ②⑦⑦  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①  
Dents : forme : ④⑦ - 41  
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44  
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥⑦ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës